



• درسنامه های جامع همراه با بررسی کامل مسائل و تمرین های کتاب درسی

• بیش از ۱۵۸۰ سؤال متنوع امتحانی شامل سوالات ۲۰+ ویژه دانش آموزان سخت کوش

خلاصه کیسولی



۱۱ کاربرگ امتحانی



## مقدمه

خطبه‌خط، نکته‌به‌نکته، دقیقاً همونیه که برای موفقیت می‌خوای، این‌جاست که باید بگیریم: دیگه لازم نیست دنبال منبع دیگه‌ای بگردی!

سلام رفقا!

حتماً می‌خواید توی امتحان‌های درس فیزیک به ۲۰ شیرین بگیرید، نه؟! خب پس خبر خوش اینه که بهترین منبع ممکن رو پیدا کردید. چرا ادعا می‌کنیم بهترین منبع؟ چون توی این کتاب، خطبه‌خط کتاب درسی رو موبه‌مو پوشش دادیم، یعنی هیچ چیزی از قلم نیفتاده! از نکته‌های ریز گرفته تا مثال‌ها، فعالیت‌ها، آزمایش‌ها، پرسش‌ها، تمرین‌های متن و آخر هر فصل و خلاصه هر چیزی که توی کتاب درسی هست رو پوشش دادیم. علاوه‌بر اون، درسنامه‌های کاملاً کاربردی و روان براتون آماده کردیم که بدون هیچ پیچیدگی اضافه‌ای، همه مفاهیم فیزیک رو قشنگ توی ذهنتون جا بندازه.

### ساختار بیست‌پک

ساختار کتابمون این‌طوره که هر چیزی رو دقیقاً سر جای خودش گذاشتیم:

**۱] درسنامه:** جمع‌وجور، ولی پرمغز! اول از همه، متن کتاب درسی رو در قالب بسته‌های آموزشی منطبق با کتاب درسی به‌طور کامل براتون بررسی کردیم، اونم با نکات و سؤال‌های مفهومی که با دقت و سخت‌گیری بسیار زیادی گلچین شدن که باعث میشه با خوندشون، ذهنتون به چالش کشیده بشه. حل سؤال‌ها رو با روش‌های کاربردی بهتون یاد دادیم که هم درس رو خوب یاد بگیرید و هم بتونید با نحوه نوشتن جواب سؤالات امتحانی به‌صورت تشریحی آشنا بشید. خلاصه که به جوری پیش رفتیم که شما بتونید با خوندن درسنامه هر بسته، کل سؤالی اون بسته رو جواب بدید.

**۲] سؤالات امتحانی:** آخر هر بسته آموزشی وارد دنیای سؤالات طبقه‌بندی‌شده میشید. جایی که هر نوع سؤالی که فکرشو بکنید این‌جا هست! سؤالات درستی یا نادرستی، جای خالی، انتخاب کلمه، تشریحی و کلی مسئله استاندارد که باعث میشه با هر مدل سؤالی که تا الان توی امتحانات تشریحی مدارس اومده و در آینده قراره بیاد، آشنا بشید؛ پس بچسبید بهش که بدجوری قراره قوی بشید.

**۳] کاربرد امتحانی:** شامل امتحان‌های فصل‌به‌فصل و نوبت اول و دوم که مطابق پروتکل امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۳ و کاملاً استاندارد طراحی شدن میشه. پس وقتی همه رو حل کردید، دیگه هیچ سؤالی نمی‌تونه غافلگیرتون کنه. ما اسمشو گذاشتیم تیر خلاص! نه بر پیکر شما که البته بر پیکر امتحان، که می‌دونیم همتون خیلی بابتش نگرانید.

**۴] خلاصه‌کپسولی:** شاید فکر کنید خیلی از کتابمون تعریف کردیم، اما هنوز تموم نشده؛ چون با دیدن این بخش واقعاً غافلگیر میشید!

وقتتون کمه؟ نمی‌دونید از کجا مرور کنید؟ این بخش مثل یه بمب انرژی، کل مفاهیم رو توی ذهنتون تثبیت می‌کنه. دیگه نیازی نیست کل درسنامه‌های کتاب رو از اول بخونید، با یه نگاه همه چی رو جمع‌بندی می‌کنید! این بخش دقیقاً همون چیزیه که شب امتحان بهش نیاز دارید! تو یه زمان کم، کل مطالب رو جمع‌بندی می‌کنید و نکته‌ای از دستتون در نمیره، مثل یه نقشه گنج که مستقیم شما رو می‌رسونه به جوابای درست! پس فقط کافیه برنامه‌ریزی کنید، شروع به خوندن کنید و با خیال راحت برید سر جلسه امتحان و نمره ۲۰ بگیرید!

### تشکر و قدردانی

در آخر از تیم محترم ویراستاری، تیم زحمت‌کش و با سلیقه تولید و هنری و همه کسانی که باعث شدن این کتاب متولد بشه، تشکر می‌کنیم.

فصل پنجم  
ترمودینامیک



## فصل پنجم

# ترمودینامیک



**مشاوره:** همیشه آخرای سال تحصیلی که میرسه به سری فصلا با عجله زیادی تدریس می‌شن و خستگی شما باعث می‌شه که این فصلا رو خوب یاد نگیرید. فصل ترمودینامیک تو فیزیک دهم دقیقاً همینجوریه؛ اما اگه درسنامه این فصل رو یکی دو بار بخونید و سؤالاتو حل کنید، متوجه می‌شید که چه قدر به زبون ساده‌ای مطالب فصل رو براتون آوردیم؛ پس اصلاً نگران نباشید و فقط روی این موضوع تمرکز کنید که انواع فرایندهای ترمودینامیکی رو همراه با ویژگی‌هاشون خوب بشناسید.

با قانون گازها که از آخرای فصل قبل بلدید، فصل شروع می‌شه که خب خیلی خوبه و استرس شما رو کم می‌کنه. اگه دنبال مباحث مهم این فصل می‌گردید میتونیم بگیم: قانون اول ترمودینامیک، محاسبه کار تو فرایندهای مختلف و نمودارهای ترمودینامیکی فرایندها از جمله مهم‌ترین مطالبی هستن که اگه خوب یادشون بگیرید، درصد زیادی از راه یادگیری این فصل رو طی کردید.

بارمبندی این فصل: آزمون نوبت دوم: ۳ نمره (۵/۰ نمره مربوط به فعالیت و آزمایش)

شماره بسته	مباحث و صفحات کتاب درسی	تعداد سؤالات نهایی خرداد ۱۴۰۳
۱	الفبای ترمودینامیک (صفحات ۱۲۸ تا ۱۲۹)	۱
۲	تبادل انرژی (صفحه ۱۲۹)	۰
۳	انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک (صفحه ۱۳۰)	۱
۴	برخی از فرایندهای ترمودینامیکی (هم حجم - هم فشار)	۱
۵	ادامه فرایندهای ترمودینامیکی (هم دما - بی‌دررو)	۰
۶	چرخه ترمودینامیکی (صفحات ۱۳۹ تا ۱۴۰)	۱
۷	ماشین‌های گرمایی (صفحات ۱۴۰ تا ۱۴۶)	۱
۸	قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی (صفحات ۱۴۶ تا ۱۴۷)	۰
۹	قانون دوم ترمودینامیک و یخچال‌ها (صفحه ۱۴۷)	۰

### الفبای ترمودینامیک

### بسته ۱

### ترمودینامیک

ترمودینامیک علمی است که به مطالعه رابطه بین گرما و کار و تبدیل گرما به کار مکانیکی می‌پردازد. در واقع پایداری انرژی و این واقعیت که گرما خودبه‌خود از جسم سرد به جسم گرم منتقل نمی‌شود، بخشی از مبانی علم ترمودینامیک را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال، در زندگی روزمره، موتور خودروها، هواپیماها، قطارها، کشتی‌ها و نیروگاه‌های تولید برق بر اساس اصول ترمودینامیکی طراحی و ساخته می‌شوند.

### کمیت‌های ماکروسکوپی

به کمیت‌های مشاهده‌پذیر مانند دما، فشار، حجم، گرمای ویژه و... که رفتار گاز را بدون آن‌که درگیر جزئیات رفتار تک‌تک مولکول‌های گاز شوند، توضیح می‌دهند، کمیت‌های ماکروسکوپی می‌گویند.

### دستگاه

در ترمودینامیک، تحولات جسم خاصی را بررسی می‌کنیم که با محیط پیرامون خود گرما و کار مبادله می‌کند و معمولاً به شکل گاز یا مایع است؛ این جسم را دستگاه می‌نامیم.



**محیط**

اجسام یا مواد پیرامون دستگاه که با آن تبادل انرژی می‌کنند را محیط می‌نامند؛ پس هر چیزی به جز دستگاه را محیط می‌نامیم.

**تذکره:** به‌طور ساده منظور از دستگاه، بخش مشخصی از ماده است که تحولات و مبادله انرژی بین آن و محیط پیرامون بررسی می‌شود.

**نکته:** تشخیص محیط و دستگاه در ترمودینامیک از اهمیت بالایی برخوردار است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

- گاز محبوس در یک سیلندر را دستگاه و سیلندر، پیستون و سایر اجزای اطراف آن را محیط می‌نامیم.
- در موتور خودرو، مخلوط هوا و بخار بنزین را دستگاه و سایر اجزای اطراف آن را محیط در نظر می‌گیریم.
- آب داخل یک کتری برقی که گرما می‌گیرد را دستگاه و اجزای کتری و سیستم گرمکن را محیط می‌نامیم.

**تبادل ترمودینامیکی**

اگر کمیت‌های قابل اندازه‌گیری دستگاه ترمودینامیکی مانند دما، فشار و حجم به‌طور خودبه‌خودی با گذشت زمان تغییر نکنند و در همه نقاط آن یکسان باشند، می‌گوییم دستگاه در حالت تعادل ترمودینامیکی است.

**تذکره:** در حالت تعادل، دما، فشار و حجم برای کل دستگاه مقدار یگانه و مشخصی است و به‌طور خودبه‌خودی تغییر نمی‌کنند.

**متغیرهای ترمودینامیکی**

کمیت‌های ماکروسکوپی دما (T)، فشار (P) و حجم (V) که از آن‌ها برای توصیف حالت تعادل ترمودینامیکی دستگاه استفاده می‌شود را متغیر ترمودینامیکی می‌گویند.

**معادله حالت**

متغیرهای ترمودینامیکی از یکدیگر مستقل نیستند و با هم رابطه دارند. رابطه بین متغیرهای ترمودینامیکی را معادله حالت می‌نامند. برای گاز آرمانی (کامل) معادله حالت مستقل از نوع گاز است و به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$P V = n R T$$

مقدار گاز (mol) فشار (Pa)  $\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$

دمای مطلق (K)  $\rightarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$

ثابت جهانی گازها (J/mol·K)  $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$

حجم (m<sup>3</sup>)  $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$   $\downarrow$

**نکته ۱:** R ثابت جهانی گازها است و مقدار آن  $R = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$  است.

**۲** مقدار گاز برحسب مول (mol) است که از رابطه مقابل به دست می‌آید:

**۲** دمای مطلق گاز است و یکای آن باید برحسب SI (کلوین) باشد.

$$n = \frac{m}{M}$$

جرم گاز (g)  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$

جرم مولی گاز (g/mol)  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$

**فرایند ترمودینامیکی**

هنگامی که دستگاه از یک حالت تعادل  $(P_1, V_1, T_1)$  به یک حالت تعادل دیگر  $(P_2, V_2, T_2)$  می‌رود، می‌گوییم یک فرایند ترمودینامیکی طی شده است.

**نکته:** برای مقایسه متغیرهای ترمودینامیکی، مقدار معینی از یک گاز کامل (ثابت  $n$ ) که یک فرایند ترمودینامیکی را طی کرده است، می‌توانیم مطابق معادله حالت گازهای کامل از رابطه مقابل استفاده کنیم:

$$P V = n R T \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} \times \frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

**تذکره:** به بیان دیگر، برای مقدار معینی گاز کامل، دمای مطلق گاز (T) با حاصل ضرب فشار و حجم گاز (PV) متناسب است؛ یعنی با افزایش حاصل ضرب PV، دمای مطلق گاز (T) افزایش می‌یابد و بالعکس.

$$T \propto PV$$

افزایش T  $\Rightarrow$  افزایش PV  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$

کاهش T  $\Rightarrow$  کاهش PV  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$

**فرایند ایستاوار**

فرایند ترمودینامیکی است که در آن دستگاه همواره بسیار نزدیک به حالت تعادل بوده و سریع به تعادل می‌رسد.


**نکته:** وقتی فرایندی ایستاوار است، می‌توان برای آن نمودار رسم کرد. برای رسم این نمودارها، چند نقطه تعادلی را تعیین کرده و با وصل کردن آن‌ها به یکدیگر، نمودار ترمودینامیکی را رسم می‌کنیم.

**سؤال** حجم یک مول گاز آرمانی در دمای  $27^\circ\text{C}$  برابر ۸L است. فشار گاز چند پاسکال است؟ ( $R = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ )

**جواب** با استفاده از معادله حالت  $PV = nRT$  می‌توان نوشت:

$$V = 8\text{L} = 8 \times 10^{-3} \text{ m}^3, T = 27 + 273 = 300 \text{ K}, n = 1$$

$$P V = n R T \Rightarrow P \times 8 \times 10^{-3} = 1 \times 8.314 \times 300 \Rightarrow P = 3.1 \times 10^5 \text{ Pa}$$



**سؤال** مخزنی با حجم ثابت ۲۱ L، محتوی مخلوطی از ۹۶ g گاز اکسیژن و ۱۱۳ g گاز نیتروژن با دمای ۲۷°C است. فشارسنجی که به این مخزن متصل است، چه عددی بر حسب اتمسفر نشان می‌دهد؟ ( $M_{O_2} = 32 \text{ g/mol}$ ,  $M_{N_2} = 28 \text{ g/mol}$ ,  $R = 8 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ ,  $P_0 = 1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$ )

**جواب** ابتدا با استفاده از رابطه  $n = \frac{m}{M}$ ، تعداد مول هر گاز را حساب کرده و با جمع کردن آن‌ها عدد مجموع را به جای  $n$  در معادله حالت قرار می‌دهیم:


$$\begin{cases} n_{O_2} = \frac{96}{32} = 3 \text{ mol} \\ n_{N_2} = \frac{113}{28} = 4 \text{ mol} \end{cases} \Rightarrow n = n_{N_2} + n_{O_2} = 4 + 3 = 7 \text{ mol}$$

حالا با استفاده از معادله حالت، فشار مطلق گاز را حساب می‌کنیم:

$$PV = nRT \Rightarrow P \times 21 \times 10^{-3} = 7 \times 8 \times 300 \Rightarrow P = 8 \times 10^5 \text{ Pa} = 8 \text{ atm}$$

می‌دانیم که فشارسنج‌ها، فشار پیمانه‌ای را نشان می‌دهند؛ پس داریم:

$$P_{\text{فشارسنج}} = P_{\text{پیمانه‌ای}} = P - P_0 = 8 - 1 = 7 \text{ atm}$$




**سؤال** در شکل مقابل، پیستون با اصطکاک ناچیز، درون یک محفظه استوانه‌ای، گازهای نیتروژن و هیدروژن را جدا از هم نگه داشته است. اگر دمای گازهای نیتروژن و هیدروژن به ترتیب ۴۷°C و ۲۷°C باشد، جرم گاز نیتروژن چند برابر جرم گاز هیدروژن است؟ ( $M_{H_2} = 2 \text{ g/mol}$ ,  $M_{N_2} = 28 \text{ g/mol}$ )

**جواب** با توجه به این که اصطکاک پیستون ناچیز است، بنابراین پیستون آزادانه حرکت می‌کند و فشار گاز در دو سمت پیستون یکسان است.


$$V = Ah \begin{cases} V_{H_2} = 21A \\ V_{N_2} = 22A \end{cases}, T = \theta + 273 \begin{cases} T_{H_2} = 27 + 273 = 300 \text{ K} \\ T_{N_2} = 47 + 273 = 320 \text{ K} \end{cases}$$

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V} \xrightarrow{P_{H_2} = P_{N_2}} \left(\frac{nRT}{V}\right)_{H_2} = \left(\frac{nRT}{V}\right)_{N_2}$$

$$\xrightarrow{n = \frac{m}{M}} \left(\frac{mT}{MV}\right)_{H_2} = \left(\frac{mT}{MV}\right)_{N_2} \Rightarrow \frac{m_{H_2} \times 300}{2 \times 21A} = \frac{m_{N_2} \times 320}{28 \times 22A} \Rightarrow \frac{m_{N_2}}{m_{H_2}} = 20$$



**سؤال** نمودار  $P-V$  ی گاز کاملی مطابق شکل مقابل است. در این فرایند، دمای مطلق گاز چند برابر شده است؟



**جواب** با توجه به این که شیب نمودار  $P-V$  ثابت است؛ پس می‌توان نوشت:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = \frac{3V_1}{V_1} = 3 \Rightarrow P_2 = 3P_1$$

حال با توجه به معادله حالت  $PV = nRT$  متوجه می‌شویم که دما با حاصل ضرب  $PV$  متناسب است و داریم:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{P_1 V_1} = \frac{3P_1 \times 3V_1}{P_1 \times V_1} = 9$$

## سؤالات امتحانی

### سؤالات انتخاب کلمه

عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

۱۰۴۷. در ترمودینامیک به مطالعه رابطه بین (گرما و کار / گرما و انرژی درونی) می‌پردازیم.

۱۰۴۸. موتور ماشین‌های بنزینی تا حدود (۳۰٪ / ۷۰٪) انرژی شیمیایی حاصل از سوختن بنزین را به کار مفید مکانیکی تبدیل می‌کند.

۱۰۴۹. جسمی که با محیط پیرامون خود گرما و کار مبادله می‌کند، (دستگاه / جسم غیرمنزوی) می‌نامند.

۱۰۵۰. اجسام پیرامون دستگاه را که می‌توانند با آن تبادل انرژی داشته باشند (محیط / جسم غیرمنزوی) می‌نامند. در موتور خودرو، مخلوط هوا و بخار بنزین

(دستگاه / محیط) نامیده می‌شود.



۱۰۵۱. در یخچال خانگی، گازی که در لوله‌های فلزی درون و بیرون یخچال جریان دارد و گرما را از درون یخچال به بیرون منتقل می‌کند (دستگاه / محیط) و مجموعه لوله‌های فلزی را (دستگاه / محیط) می‌نامند.
۱۰۵۲. آبی که در یک کتری برقی قرار دارد و به آن گرما داده می‌شود تا به بخار تبدیل شود را (دستگاه / محیط) و کتری، سیم گرمکن آن و هوا، اجزای (دستگاه / محیط) هستند.
۱۰۵۳. یک دستگاه ترمودینامیکی در صورتی در حالت تعادل ترمودینامیکی است که متغیرهای ترمودینامیکی آن به طور خودبه‌خودی تغییر نکند / نکند.
۱۰۵۴. متغیرهای ترمودینامیکی مستقل از یکدیگر (نیستند / هستند).
۱۰۵۵. رابطه بین متغیرهای ترمودینامیکی را (معادله ترمودینامیکی / معادله حالت) می‌نامند.
۱۰۵۶. اگر گاز، آرمانی (کامل) باشد، معادله حالت آن ساده و (مستقل از / وابسته به) نوع گاز است.
۱۰۵۷. هنگامی که دستگاه از یک حالت تعادل به حالت تعادل دیگر می‌رود، می‌گوییم یک (معادله حالت / فرایند ترمودینامیکی) انجام شده است.
۱۰۵۸. وقتی فرایندی ایستاوار باشد، (می‌توان / نمی‌توان) برای آن نمودار رسم کرد.


## سؤالات درست و نادرست

درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را مشخص کنید.

۱۰۵۹. در ترمودینامیک به مطالعه رابطه بین گرما و دما و تبدیل گرما به دما و بالعکس می‌پردازیم.
۱۰۶۰. اجسام پیرامون دستگاه که می‌توانند با آن تبادل انرژی داشته باشند را محیط می‌نامیم.
۱۰۶۱. در موتورهای خودرو، مخلوط هوا و بخار بنزین را محیط نظر می‌گیریم.
۱۰۶۲. منظور از دستگاه بخشی از ماده است که تحولات و مبادله انرژی بین آن و محیط پیرامون بررسی می‌شود.
۱۰۶۳. کمیت‌های ماکروسکوپی که حالت تعادل با آن‌ها توصیف می‌شود را متغیرهای ترمودینامیکی گاز می‌نامیم.
۱۰۶۴. یک دستگاه ترمودینامیکی در صورتی در حالت تعادل ترمودینامیکی است که متغیرهای ترمودینامیکی آن به طور خودبه‌خودی تغییر نکند.
۱۰۶۵. متغیرهای ترمودینامیکی مستقل از یکدیگر هستند.
۱۰۶۶. رابطه بین متغیرهای ترمودینامیکی را معادله حالت می‌نامند.
۱۰۶۷. حالت تعادل یک دستگاه را می‌توان برحسب متغیرهای ترمودینامیکی  $P$ ،  $V$  و  $T$  بیان کرد.
۱۰۶۸. هنگامی که دستگاه از یک حالت تعادل به حالت تعادل دیگر می‌رود، می‌گوییم یک معادله حالت اتفاق افتاده است.
۱۰۶۹. فرایندی که در طول آن دستگاه همواره بسیار نزدیک به حالت تعادل بوده و سریع به تعادل می‌رسد را فرایند ایستاوار می‌نامند.

## مسائل

۱۰۷۰. تعداد مول‌های یک گاز در فشار  $1 \text{ atm}$  در اتاقی به ابعاد  $6 \text{ m}$ ،  $5 \text{ m}$  و  $2 \text{ m}$  در دمای  $27^\circ \text{C}$  چه قدر است؟ ( $R = 8 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ )
۱۰۷۱.  $2 \text{ mol}$  گاز درون مخزنی  $3 \text{ L}$  و فشار  $64 \text{ atm}$  وجود دارد. دمای گاز چند درجه سلسیوس است؟ ( $R = 8 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$ )
۱۰۷۲. درون استوانه‌ای به حجم  $20 \text{ L}$ ، مقداری گاز آرمانی با دمای  $7^\circ \text{C}$  و فشار  $5 \text{ atm}$  وجود دارد. اگر حجم استوانه را به  $10 \text{ L}$  و دما را به  $27^\circ \text{C}$  برسانیم، فشار گاز چند اتمسفر است؟
۱۰۷۳.  $+20$  در ظرفی به حجم  $5 \text{ L}$  گاز هیدروژن با فشار  $3 \text{ atm}$  و در ظرف دیگری گاز هیدروژن به حجم  $15 \text{ L}$  با فشار  $5 \text{ atm}$  در دماهای مساوی موجودند. اگر این ظرف را با لوله‌های نازکی به هم متصل کنیم، فشار مخلوط این دو گاز را به دست آورید.
۱۰۷۴.  $+20$  داخل یک مخزن فلزی  $20 \text{ L}$  هوا با فشار  $15 \text{ atm}$  و دمای  $27^\circ \text{C}$  موجود است. مقداری از هوای این مخزن را خارج می‌کنیم تا فشار گاز باقی مانده به  $7 \text{ atm}$  و دمای آن به  $7^\circ \text{C}$  برسد. حجم هوای خارج شده از مخزن در فشار  $4 \text{ atm}$  و دمای  $47^\circ \text{C}$  چند لیتر است؟
۱۰۷۵.  $+20$  درون یک استوانه مطابق شکل، پیستون عایقی قرار دارد که می‌تواند بدون اصطکاک و آزادانه جابه‌جا شود. پیستون در حالت تعادل است. اگر جرم هیدروژن و اکسیژن در دو طرف با هم برابر باشند، طول  $x$  چند سانتی‌متر است؟ ( $M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$ ,  $M_{\text{O}_2} = 32 \text{ g/mol}$ )





تبادل انرژی بین محیط و دستگاه از دو طریق ۱) گرما و ۲) کار صورت می‌گیرد.

### گرما

گرما انرژی است که به سبب اختلاف دما، بین دو جسم مبادله می‌شود. محیط و دستگاه نیز با یکدیگر گرما مبادله می‌کنند که آن را با  $Q$  نمایش می‌دهند. در مورد علامت  $Q$  با دو حالت روبه‌رو هستیم:

**حالت اول:** اگر دستگاه گرما بگیرد،  $Q$  مثبت است ( $Q > 0$ ).

**حالت دوم:** اگر دستگاه گرما از دست بدهد،  $Q$  منفی است ( $Q < 0$ ).

### منبع گرما


معمولاً فرض می‌شود که دستگاه در حین تبادل گرما، در تماس با یک منبع گرما است. منبع گرما جسمی است که جرم آن در مقابل جرم دستگاهی که با آن مبادله گرما می‌کند، چنان بزرگ است که می‌تواند بدون آن که دمای آن تغییر محسوسی کند، مقدار زیادی گرما بگیرد یا از دست بدهد.

**مثال:** یک استکان چای داغ یا یک قطعه یخ را در یک اتاق فرض کنید. پس از مدتی بدون آن که دمای هوای اتاق تغییر محسوسی پیدا کند، چای خنک شده و یخ ذوب می‌شود و دمای آن با دمای هوای اتاق یکسان می‌شود. در این مثال، هوای اتاق برای قطعه یخ یا استکان چای یک منبع گرمایی محسوب می‌شود.

**تذکره:** در آزمایشگاه، منبع گرما وسیله‌ای است که دمای آن توسط آزمایشگر تنظیم می‌شود و می‌تواند به دستگاه گرما بدهد یا از آن گرما بگیرد.

### کار

هنگامی که حجم دستگاه تغییر کند، انرژی به صورت کار بین دستگاه و محیط مبادله می‌شود. به‌طور مثال، مقداری گاز را در یک استوانه مطابق شکل در نظر بگیرید (دستگاه همان گاز درون استوانه است). همان‌طور که مشاهده می‌کنید بر پیستون دو نیروی گاز  $\vec{F}_{\text{گاز}}$  و محیط  $\vec{F}_{\text{محیط}}$  وارد می‌شود.



در نتیجه با جابه‌جایی پیستون و تغییر حجم، هر یک از این دو نیرو کار انجام می‌دهند؛ بنابراین در ترمودینامیک با دو نوع کار سروکار داریم: ۱) کاری که محیط روی دستگاه انجام می‌دهد. ( $W$ ) ۲) کاری که دستگاه روی محیط انجام می‌دهد. ( $W'$ )


**نکته:** ۱) در طی یک فرایند ایستاوار،  $|F_{\text{محیط}}| = |F_{\text{گاز}}|$  و در خلاف جهت یکدیگرند؛ بنابراین  $|W|$  با  $|W'|$  نیز برابر و همواره قرینه یکدیگرند:

$$W = -W'$$

۲) در کتاب فیزیک دهم، منظور از کار، کاری است که محیط روی دستگاه انجام می‌دهد ( $W$ )؛ بنابراین در ترمودینامیک با توجه به تغییر حجم حالت‌های مختلفی مطابق جدول زیر داریم:

نحوه تغییر حجم	عدم تغییر ( $\Delta V = 0$ )	انبساط ( $\Delta V > 0$ )	تراکم ( $\Delta V < 0$ )
علامت کار محیط روی دستگاه ( $W$ )	$W = 0$	$W < 0$	$W > 0$
علامت کار دستگاه روی محیط ( $W'$ )	$W' = 0$	$W' > 0$	$W' < 0$
نحوه تبادل انرژی	کار صفر است و دستگاه (گاز) از این طریق انرژی مبادله نمی‌کند.	دستگاه از طریق کار انرژی از دست می‌دهد.	دستگاه از طریق کار انرژی می‌گیرد.

### محاسبه کار در یک فرایند ترمودینامیکی



برای محاسبه کار در یک فرایند ترمودینامیکی، مطابق شکل می‌توانیم از نمودار فشار گاز بر حسب حجم آن کمک بگیریم؛ به این صورت که مساحت سطح زیر نمودار  $P - V$  در هر نوع فرایندی برابر با اندازه کار انجام شده روی گاز طی آن فرایند است.


$$S = |W|$$

دقت کنید که علامت کار با توجه به تراکمی یا انبساطی بودن فرایند تعیین می‌شود:


تراکم ( $\Delta V < 0$ )	انبساط ( $\Delta V > 0$ )
$W > 0 \Rightarrow W = S$	$W < 0 \Rightarrow W = -S$



**تذکره:** همیشه حواستان به این موضوع باشد که یکای  $P$  باید برحسب  $\text{Pa}$  و یکای  $V$  باید برحسب  $\text{m}^3$  باشد؛ در این صورت مساحت سطح زیر نمودار  $P-V$  که از جنس کار (انرژی) است، برحسب ژول ( $J$ ) محاسبه خواهد شد.



**سؤال** گاز کاملی فرایندی را مطابق شکل مقابل طی می‌کند.  
الف) کار انجام شده روی گاز طی این فرایند چند کیلوژول است؟  
ب) کار انجام شده توسط گاز روی محیط چند کیلوژول است؟



**جواب** الف) می‌دانیم که مساحت سطح زیر نمودار  $P-V$  برابر اندازه کار انجام شده طی این فرایند است:


$$|W| = S_1 + S_2 = \left( \frac{2 \times 10^4 + 3 \times 10^4}{2} \times 2 \right) + (3 \times 10^4 \times 2)$$

$$\Rightarrow |W| = (5 \times 10^4) + (6 \times 10^4) = 11 \times 10^4 J = 110 \text{ kJ}$$

$$W = -110 \text{ kJ}$$

$$W' = -W = 110 \text{ kJ}$$

با توجه به این‌که فرایند انبساطی است،  $W < 0$  است و در نتیجه داریم:  
ب) با توجه به رابطه  $W' = -W$  می‌توان نوشت:



**سؤال** مطابق شکل، مقدار معینی گاز کامل طی دو فرایند (۱) و (۲) از حالت  $a$  به حالت  $b$  می‌رود. اندازه کار انجام شده طی دو فرایند را با ذکر دلیل مقایسه کنید.

**جواب** با توجه به این‌که مساحت سطح زیر نمودار  $P-V$ ، اندازه کار انجام شده طی فرایند را نشان می‌دهد و با توجه به این‌که مساحت سطح زیر نمودار در فرایند (۱) بیشتر از فرایند (۲) است، پس داریم:

$$S_1 > S_2 \Rightarrow |W_1| > |W_2|$$

## سوالات امتحانی

### سوالات انتخاب کلمه

عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

۱۰۷۶. تبادل بین محیط و دستگاه از دو طریق (انرژی درونی و کار / کار و گرما) صورت می‌گیرد.
۱۰۷۷. گرما انرژی‌ای است که به علت (اختلاف دما / اختلاف انرژی)، بین دو جسم مبادله می‌شود.
۱۰۷۸. بنا به قرارداد، گرمایی که دستگاه می‌گیرد، با علامت (مثبت / منفی) نشان می‌دهیم.
۱۰۷۹. بنا به قرارداد، گرمایی که دستگاه از دست می‌دهد، با علامت (مثبت / منفی) نشان می‌دهیم.
۱۰۸۰. در حالت کلی جرم منبع گرما نسبت به دستگاه بسیار (بزرگ‌تر / کوچک‌تر) است.
۱۰۸۱. منبع گرما، جسمی است که اگر گرما بگیرد، دمایش (بالا می‌رود / پایین می‌آید) / تغییر نمی‌کند.

### سوالات درست و نادرست

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۱۰۸۲. معمولاً فرض می‌شود که دستگاه در حین تبادل گرما، در تماس با یک منبع گرما است.
۱۰۸۳. محیط و دستگاه هنگامی مبادله گرما دارند که با هم اختلاف دما داشته باشند.
۱۰۸۴. منبع گرما جسمی است که هرگاه گرما می‌گیرد، دمایش افزایش و هرگاه گرما از دست می‌دهد، دمایش کاهش می‌یابد.
۱۰۸۵. در آزمایشگاه، منبع گرما می‌تواند وسیله‌ای باشد که تنظیم دمای آن توسط آزمایشگر صورت می‌گیرد و می‌تواند به دستگاه گرما بدهد یا از آن گرما بگیرد.




## سوالات تشریحی


۱۰۸۶. آیا هوای اتاق برای یک استکان چای داغ می‌تواند منبع گرما باشد؟ توضیح دهید.

۱۰۸۷. آب یک استخر برای یک میله داغ می‌تواند منبع گرما باشد؟ توضیح دهید.

۱۰۸۸. در شکل روبه‌رو، گاز داخل استوانه را به عنوان دستگاه در نظر می‌گیریم. اگر پیستون به سمت چپ حرکت داده شود و کار محیط روی دستگاه را  $W_1$  و کار دستگاه روی محیط را  $W_2$  بنامیم، چه رابطه‌ای بین  $W_1$  و  $W_2$  برقرار است؟




۱۰۸۹. مطابق شکل، مقدار معینی گاز کامل از طریق فرایندهای  $ab$  و  $bc$  از حالت  $a$  به حالت  $c$  می‌رود و سپس از فرایندهای  $cd$  و  $da$  از حالت  $c$  به حالت  $a$  برمی‌گردد. اگر کار انجام شده روی گاز در مسیر  $abc$  و  $cda$  به ترتیب  $W_1$  و  $W_2$  باشد،  $|W_1|$  را با  $|W_2|$  مقایسه کنید.




## مسائل

۱۰۹۰. مقداری گاز هلیوم، فرایند ایستاوار روبه‌رو را طی کرده است. کار انجام شده روی گاز در کل فرایند چند ژول است؟




۱۰۹۱. در شکل مقابل، نمودار  $P-V$  فرایندی را مشاهده می‌کنید. کار انجام شده روی گاز در کل فرایند چند ژول است؟



۱۰۹۲. مقداری گاز کامل فرایند ایستاوار روبه‌رو را طی کرده است.

الف) کار انجام شده روی گاز در فرایند ABC چند ژول است؟

ب) در فرایند ABC، گاز چند ژول کار روی محیط انجام داده است؟



## انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک

### بسته ۳

### انرژی درونی

انرژی درونی یک ماده با مجموع انرژی‌های اجزای تشکیل دهنده آن برابر است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که انرژی درونی ماده ( $U$ ) با مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل ذره‌های آن ماده برابر است.

**نکته ۱:** انرژی درونی مقدار معینی گاز کامل فقط تابعی از دمای مطلق آن است ( $U \propto T$ )؛ یعنی انرژی درونی یک گاز کامل تنها در حالتی تغییر می‌کند که دمای آن گاز تغییر کند.

نحوه تغییرات دمای مطلق گاز کامل ( $T$ ):

$T$  افزایش  $\Leftarrow$  انرژی درونی افزایش می‌یابد.

$T$  کاهش  $\Leftarrow$  انرژی درونی کاهش می‌یابد.


$T$  ثابت  $\Leftarrow$  انرژی درونی ثابت می‌ماند.

**نکته ۲:** با توجه به نکته بالا و معادله حالت برای مقدار معینی گاز کامل (ثابت  $n$ ) می‌توان نوشت:

$$\begin{cases} U \propto T \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{T_2}{T_1} \\ PV = nRT \xrightarrow{\text{ثابت } R, n} \frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \times \frac{V_2}{V_1} \end{cases} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2}{P_1} \times \frac{V_2}{V_1}$$



# پاسخ نامه



پاسخ فصل اول

۲۹. نادرست (مسافتی که نور در مدت یک سال در خلأ می‌پیماید را سال نوری می‌نامند و یکای نجومی برابر میانگین فاصله زمین تا خورشید است.)
۳۰. درست (یکای اصلی کمیت فشار پاسکال (Pa) و کمیت فرعی آن  $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$  است و در فصل بعدی درباره این یکا بیشتر می‌خوانیم 😊)
۳۱. نادرست (نماد کندلا cd است نه cnd)
۳۲. درست
۳۳. گزینه ۳ (مساحت جهت ندارد؛ پس کمیت نرده‌ای است و از حاصل ضرب طول و عرض به دست آمده؛ پس فرعی است. یادمان باشد کمیت‌های فرعی از کمیت‌های اصلی و قوانین فیزیکی پدید می‌آیند.)
۳۴. گزینه ۱ یکای نیرو  $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$  می‌باشد.
۳۵. در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت کمیت گفته می‌شود. کمیت نرده‌ای: برای بیان برخی از کمیت‌های فیزیکی، تنها از یک عدد و یکای مناسب آن استفاده می‌شود. این کمیت‌ها، کمیت نرده‌ای نامیده می‌شوند؛ مانند جرم. کمیت برداری: برای بیان برخی دیگر از کمیت‌های فیزیکی، افزون بر یک عدد و یکای مناسب آن، لازم است به جهت آن نیز اشاره کنیم و این کمیت‌ها از قوانین جمع برداری تبعیت می‌کنند؛ مانند جابه‌جایی.
- کمیت اصلی: ۷ کمیت فیزیکی که به طور مستقل انتخاب شده‌اند و برای آن‌ها یکای مستقل انتخاب شده است.
- کمیت فرعی: کمیت‌هایی که برحسب کمیت‌های اصلی و به کمک روابط تعیین می‌شود؛ مانند نیرو.
۳۶. در فیزیک تغییر هر کمیت نسبت به زمان را معمولاً آهنگ آن کمیت می‌نامیم.
۳۷. برداری: شتاب - نیرو - وزن - جابه‌جایی
- نرده‌ای: جرم - دما - مسافت طی شده - فشار - شدت جریان
۳۸. اصلی: شمع - ثانیه - آمپر - کیلوگرم
- فرعی: متر مربع - گرم - سانتی‌گراد - متر بر ثانیه - کیلوگرم بر متر مکعب

**یادآوری:** هفت یکای اصلی عبارت‌اند از: ۱ متر ۲ کیلوگرم ۳ ثانیه ۴ کلونین ۵ مول ۶ آمپر ۷ کندلا

یکای فرعی	یکای SI	کمیت
$\text{kg} / \text{ms}^2$	Pa	فشار
$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$	W	توان
$\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$	N	نیرو
$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$	J	کار

۴۰. تعدادی پونز (مثلاً ۱۰۰ عدد) را روی ترازو ریخته و جرم کل آن‌ها را اندازه‌گیری می‌کنیم. عدد به دست آمده را بر تعداد پونزها تقسیم می‌کنیم تا جرم حدودی یک پونز به دست آید.
۴۱. درون یک استوانه مدرج مقداری آب ریخته و حجم آن را یادداشت می‌کنیم؛ سپس تعدادی پونز (مثلاً ۵۰ عدد) را درون همین استوانه مدرج ریخته و حجم آب را دوباره یادداشت می‌کنیم. با کم کردن این دو مقدار حجم ۵۰ عدد پونز به دست می‌آید که اگر آن را به ۵۰ تقسیم کنیم حجم حدودی یک پونز به دست می‌آید.
۴۲. جرم تعدادی سوزن ته‌گرد (مثلاً ۳۰ عدد) را به وسیله ترازو اندازه می‌گیریم. اندازه نشان داده شده توسط ترازو را بر ۳۰ تقسیم می‌کنیم. مقدار به دست آمده جرم یک سوزن ته‌گرد است.
۴۳. ابتدا جرم و حجم تعداد مشخصی قطره آب را اندازه می‌گیریم. جرم توسط ترازو و حجم توسط استوانه مدرج اندازه‌گیری می‌شود؛ سپس مقدارهای به دست آمده را بر تعداد قطره‌ها تقسیم می‌کنیم.

۱. آزمون پذیری، اصلاح نظریه‌های فیزیکی
۲. تفکر نقادانه، اندیشه‌ورزی فعال
۳. مدل‌ها، نظریه‌های فیزیکی
۴. مقاومت هوا
۵. مقاومت هوا
۶. درست همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش‌های جدید منجر به بازنگری مدل یا نظریه‌ای شود و حتی ممکن است نظریه‌ای جدید جایگزین آن شود.
۷. نادرست ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است.
۸. نادرست فیزیک، پایه و اساس تمامی مهندسی‌ها و فناوری‌هاست.
۹. نادرست در صورت نادیده گرفتن اصطکاک، دیگر امکان راه رفتن وجود نخواهد داشت.
۱۰. نادرست اگر جاذبه را نادیده بگیریم، توپ همواره به حرکت رو به بالای خود ادامه خواهد داد.
۱۱. نادرست در صورت در نظر گرفتن خلأ، امکان بال زدن پرنده و هل دادن هوا به سمت عقب برای جلو رفتن خودش وجود نخواهد داشت.
۱۲. درست
۱۳. درست هنگام مدل سازی یک پدیده فیزیکی، باید اثرهای جزئی را نادیده بگیریم نه اثرهای مهم و تعیین کننده را.
۱۴. مدل سازی در فیزیک فرایندی است که طی آن یک پدیده فیزیکی، آن قدر ساده و آرمانی می‌شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.
۱۵. باید از اثرهای جزئی چشم‌پوشی شود تا بتوان روی ویژگی‌های مهم تعیین کننده تمرکز کرد.
۱۶. گزینه ۱ می‌تواند مدل سازی هل دادن میز توسط شخص باشد؛ زیرا جسم را به صورت یک ذره نمایش داده است، همچنین نیروی دست باید بزرگ‌تر از نیروی اصطکاک باشد تا جسم به حرکت در بیاید.
۱۷. گزینه ۲ با توجه به نوع حرکت برگ این گزینه مدل سازی درست را نشان می‌دهد. (از آن جایی که حرکت به سمت پایین است، یعنی نیروی وزن بیشتر است.)
۱۸. می‌توانیم پرتوهای نور را به شکل فلش‌هایی نشان دهیم که از چشمه نور، خارج می‌شوند.




۱۹. الف) توپ را به صورت جسم نقطه‌ای یا ذره در نظر می‌گیریم.
- ب) از اثر مقاومت هوا صرف نظر می‌کنیم.
- پ) فرض می‌کنیم با تغییر فاصله از مرکز زمین، وزن توپ ثابت می‌ماند.



۲۱. اسکالر
۲۲. فرعی
۲۳.  $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$
۲۴. برداری

۲۵. فاصله (مسافتی که نور در یک سال در خلأ می‌پیماید، سال نوری می‌گویند.)
۲۶. درست
۲۷. درست (شتاب علاوه بر عدد و یکا دارای جهت می‌باشد؛ بنابراین برداری است.)
۲۸. نادرست (کمیت‌های برداری علاوه بر عدد و یکا جهت نیز دارند و کمیت‌های نرده‌ای فقط دارای عدد و یکا می‌باشند.)





$$0.012 \text{ m} \times \left(\frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}}\right) = 0.012 \times 10^2 \text{ cm} = 1.2 \text{ cm}$$

$$2200 \text{ mg} \times \left(\frac{10^{-3} \text{ g}}{1 \text{ mg}}\right) \times \left(\frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}}\right) \\ = 2200 \times 10^{-6} \text{ kg} = 2.2 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

$$50 \text{ min} \times \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} \times \frac{1 \text{ روز}}{24 \text{ h}} \times \frac{1 \text{ سال}}{365 \text{ روز}} \times \frac{1 \text{ قرن}}{100 \text{ سال}} \times \frac{10^6 \text{ میکروقرن}}{1 \text{ قرن}} \\ \approx 9.5 \times 10^{-1} \text{ میکروقرن}$$

$$12 \mu\text{m}^2 \times \frac{(10^{-6} \text{ m})^2}{(\mu\text{m})^2} = 12 \times 10^{-12} \text{ m}^2 = 1.2 \times 10^{-11} \text{ m}^2$$

$$8 \text{ cm}^2 \times \frac{(10 \text{ mm})^2}{\text{cm}^2} = 800 \text{ mm}^2 = 8 \times 10^2 \text{ mm}^2$$

$$10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ km}}{10^3 \text{ m}} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} = 36 \text{ km/h}$$

$$4500 \text{ mm}^2 \times \frac{(10^{-3} \text{ m})^2}{1 \text{ mm}^2} = 4500 \text{ mm}^2 \times \frac{10^{-6} \text{ m}^2}{1 \text{ mm}^2} \\ = 4500 \times 10^{-6} \text{ m}^2 = 4.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$50 \text{ cm}^2 \times \left(\frac{10^{-2} \text{ m}}{1 \text{ cm}}\right)^2 \times \left(\frac{1 \text{ km}}{10^3 \text{ m}}\right)^2 \\ = 50 \text{ cm}^2 \times \frac{10^{-4} \text{ m}^2}{1 \text{ cm}^2} \times \frac{1 \text{ km}^2}{10^6 \text{ m}^2} = 50 \times 10^{-4} \times 10^{-6} \text{ km}^2 \\ \Rightarrow 50 \text{ cm}^2 = 5 \times 10^{-9} \text{ km}^2$$

$$0.08 \text{ Gm}^2 \times \left(\frac{10^9 \text{ m}}{1 \text{ Gm}}\right)^2 \times \left(\frac{1 \text{ pm}}{10^{-12} \text{ m}}\right)^2 \\ = 0.08 \text{ Gm}^2 \times \frac{10^{18} \text{ m}^2}{1 \text{ Gm}^2} \times \frac{1 \text{ pm}^2}{10^{-24} \text{ m}^2} \\ = 0.08 \times \frac{10^{18}}{10^{-24}} \text{ pm}^2 = 0.08 \times 10^{42} \text{ pm}^2 \Rightarrow 0.08 \text{ Gm}^2 = 8 \times 10^4 \text{ pm}^2$$

$$360 \frac{\text{m}}{\text{min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 6 \text{ m/s}$$

$$1 \text{ میکروقرن} = 10^{-6} \text{ قرن} \times \frac{100 \text{ سال}}{1 \text{ قرن}} \times \frac{365 \text{ روز}}{1 \text{ سال}} \times \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ روز}} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ h}} \\ = 10^{-6} \times 100 \times 365 \times 24 \times 60 \text{ min} = 52.56 \text{ min}$$

$$1 \times 10^9 \text{ s} = 1 \times 10^9 \text{ s} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \times \frac{1 \text{ روز}}{24 \text{ h}} \times \frac{1 \text{ سال}}{365 \text{ روز}} = 31.71 \text{ سال}$$

پ. نخ را دور خطکش میلی متری طوری می پیچیم که کاملاً مجاور هم قرار بگیرند. از روی خطکش طول نخ‌های پیچیده شده را اندازه می گیریم. طول را به تعداد دور تقسیم کرده و قطر نخ را به دست می آوریم.

ت. الف. توجه کنید که چه بگوییم فاصله زمین و چه بگوییم فاصله منظومه شمسی تا نزدیکترین ستاره بعد از خورشید، به دلیل فاصله بسیار زیاد نزدیکترین ستاره نسبت به منظومه شمسی تفاوتی با هم ندارند، به این ترتیب فاصله زمین تا نزدیکترین ستاره بعد از خورشید برحسب یکای نجومی برابر است با:

$$4 \times 10^{16} \text{ m} = 4 \times 10^{16} \text{ m} \times \left(\frac{1 \text{ AU}}{1.5 \times 10^{11} \text{ m}}\right) \approx 2.6 \times 10^5 \text{ AU}$$

ب. ابتدا یک سال نوری را برحسب متر حساب می کنیم:

$$1 \text{ ly} = (365 \times 24 \times 60 \times 60 \text{ s}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})$$

$$\Rightarrow 1 \text{ ly} = (3.15 \times 10^7 \text{ s}) (3 \times 10^8 \text{ m/s}) \Rightarrow 1 \text{ ly} = 9.45 \times 10^{15} \text{ m}$$

به ترتیب فاصله کوازارها (اخترش) تا منظومه شمسی برحسب سال نوری برابر است با:

$$1 \times 10^{26} \text{ m} = (1 \times 10^{26} \text{ m}) \times \left(\frac{1 \text{ ly}}{9.45 \times 10^{15} \text{ m}}\right) = 1.05 \times 10^{10} \text{ ly}$$

ح. روش تبدیل زنجیره ای برای تبدیل یکاها، به خصوص وقتی می خواهیم چندین یکا را به یکاهای مورد نظر تبدیل کنیم روشی مفید و کم اشتباه است.

$$125 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} = 125 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} (1) \times (1) \\ = 125 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 7.5 \frac{\text{L}}{\text{min}}$$

$$1 \text{ خروار} = 1 \text{ خروار} \times \frac{100 \text{ من تبریز}}{1 \text{ خروار}} \times \frac{640 \text{ مثقال}}{1 \text{ من تبریز}} \times \frac{4.68 \text{ g}}{1 \text{ مثقال}} \quad 47$$

$$\Rightarrow 1 \text{ خروار} = 299 \times 10^2 \text{ g} = 299 \text{ kg}$$

$$1 \text{ من تبریز} = 1 \text{ من تبریز} \times \frac{1 \text{ خروار}}{100 \text{ من تبریز}} \times \frac{299 \times 10^2 \text{ g}}{1 \text{ خروار}}$$

$$= 2.99 \times 10^2 \text{ g} = 2.99 \text{ kg}$$

$$1 \text{ سیر} = 1 \text{ سیر} \times \frac{640 \text{ مثقال}}{40 \text{ سیر}} \times \frac{4.68 \text{ g}}{1 \text{ مثقال}}$$

$$= 74.9 \text{ g} = 7.49 \times 10^{-2} \text{ kg}$$

$$1 \text{ نخود} = 1 \text{ نخود} \times \frac{1 \text{ مثقال}}{24 \text{ نخود}} \times \frac{4.68 \text{ g}}{1 \text{ مثقال}}$$

$$\Rightarrow 1 \text{ نخود} \approx 0.195 \text{ g} = 0.195 \times 10^{-3} \text{ kg} \Rightarrow 1 \text{ نخود} \approx 1.95 \times 10^{-4} \text{ kg}$$

$$1 \text{ گندم} = 1 \text{ گندم} \times \frac{1 \text{ مثقال}}{96 \text{ گندم}} \times \frac{4.68 \text{ g}}{1 \text{ مثقال}} \approx 0.049 \text{ g} = 0.049 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

الف. 49

$$5 \mu\text{m} \times \left(\frac{10^{-6} \text{ m}}{1 \mu\text{m}}\right) \times \left(\frac{1 \text{ nm}}{10^{-9} \text{ m}}\right) = 5 \times 10^3 \text{ nm} \quad 48$$

ب.

$$420 \text{ mm} \times \left(\frac{10^{-3} \text{ m}}{1 \text{ mm}}\right) \times \left(\frac{1 \text{ km}}{10^3 \text{ m}}\right) \\ = 420 \times 10^{-6} \text{ km} = 4.2 \times 10^{-4} \text{ km}$$

برای تبدیل  $91 \text{ km}^2$  به هکتار از دو تبدیل  $10^4 \text{ m}^2 = 1 \text{ هکتار}$  و  $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$  استفاده می‌کنیم.

$$91 \text{ km}^2 \times \left(\frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}}\right)^2 \times \frac{1 \text{ هکتار}}{10^4 \text{ m}^2}$$

$$= 91 \text{ km}^2 \times \frac{10^6 \text{ m}^2}{1 \text{ km}^2} \times \frac{1 \text{ هکتار}}{10^4 \text{ m}^2} = 9100 \text{ هکتار}$$

۵۸. برای تبدیل  $72 \text{ km/h}$  به گره از سه تبدیل  $1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$  و  $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$  و  $1 \text{ گره} = 0.5 \text{ m/s}$  استفاده می‌کنیم.

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ گره}}{0.5 \text{ m/s}}$$

$$= \frac{72 \times 1000}{3600 \times 0.5} = \frac{20 \text{ گره}}{0.5} = 40 \text{ گره}$$

تا این جا باید متوجه شده باشی که اون چیزی که می‌خواهیم از بین ببریم تو مخرج و اون چیزی که می‌خواهیم تولید کنیم تو صورت می‌نویسیم.

۵۹. ابتدا باید حساب کنیم ۵۰ سال چند ماه است.

$$50 \text{ سال} \times \frac{12 \text{ ماه}}{1 \text{ سال}} = 600 \text{ ماه}$$

آهنگ رشد موی شخص  $1/2 \text{ cm}$  در ماه است؛ پس می‌توان با یک طرفین وسطین به جواب رسید:

$$\frac{1/2 \text{ cm}}{1 \text{ ماه}} = \frac{? \text{ cm}}{600 \text{ ماه}}$$

$$\frac{1/2 \text{ cm} \times 600 \text{ ماه}}{1 \text{ ماه}} = 120 \times 6 \text{ cm} = 720 \text{ cm}$$

باتوجه به این که طول موی شخص  $5 \text{ cm}$  بوده، پس از ۵۰ سال طول موی شخص  $725 \text{ cm}$  خواهد بود.

۶۰. بچه‌ها این سؤال، سؤال ۵ نهایی رشته ریاضی هست که بارم  $75/0$  نمره بهش اختصاص داده شده، من این جا راه حل راهنمای تصحیح رو آوردم با مقدار نمره‌ای که به هر قسمت اختصاص داده شده.

$$\frac{3/6 \text{ m}}{12 \text{ day}} = \frac{? \text{ mm}}{\text{h}}$$

$$\frac{3/6 \text{ m}}{12 \text{ day}} \times \frac{1000 \text{ mm}}{1 \text{ m}} \times \frac{1 \text{ day}}{24 \text{ h}} \quad (0/5) = 12/5 \text{ mm/h} \quad (0/25)$$

۶۱. بچه‌ها سؤال ۶۱ رو  $75/1$  نمره بهش اختصاص دادند، برای این سؤال هم عیناً راه حل راهنمای تصحیح رو آوردم تا با بارم‌بندی آشنا شوید.

$$\frac{40 \text{ cm}^3}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} = 2/4 \frac{\text{L}}{\text{min}} \quad (0/25)$$

$$\text{آهنگ خروجی آب از مخزن} = \frac{\Delta V}{\Delta t} \Rightarrow 2/4 \frac{\text{L}}{\text{min}} = \frac{1800 \text{ L}}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{1800}{2/4} = 750 \text{ min} \quad (0/5)$$

۶۲. این سؤال، سؤال شماره ۵ از امتحانات شبه‌نهایی  $1403$  رشته تجربی هست. بارم این سؤال  $75/0$  نمره هست. ببینیم به هر قسمت از راه حل چه مقدار نمره تعلق می‌گیره.

$$12 \text{ km} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ cm}}{10^{-2} \text{ m}} \times \frac{1 \text{ ذره}}{10^4 \text{ cm}} \approx \frac{1/154 \times 10^4}{(0/25)}$$

**توجه:** توجه داشته باشید که در پرسش آخر فصل کتاب درسی، طول جزیره قشم  $120 \text{ km}$  ذکر شده که در این جا طراح در صورت سؤال اشتباهاً  $12 \text{ km}$  ذکر کرده و ما باید همین عدد را در پاسخ لحاظ کنیم.

۵۰. با توجه به فرض مسئله ابتدا مساحت سطح زمین را بر حسب  $\text{m}^2$  و سپس بر حسب هکتار محاسبه می‌کنیم:

$$6400 \text{ km} = 6400 \times 10^3 \text{ m} = 6/4 \times 10^6 \text{ m}$$

$$A = 4\pi R^2 = 4 \times 3/14 \times (6/4 \times 10^6 \text{ m})^2 = 5/14 \times 10^{14} \text{ m}^2$$

$$A = 5/14 \times 10^{14} \text{ m}^2 \times \frac{1 \text{ هکتار}}{10^4 \text{ m}^2} = 5/14 \times 10^{10} \text{ هکتار}$$

۵۱. باروش زنجیره‌ای و اطلاعاتی که مسئله به ما داده به راحتی به جواب می‌رسیم:

$$200 \text{ mg} \times \frac{1 \text{ g}}{10^3 \text{ mg}} \times \frac{182 \text{ قیراط}}{1 \text{ قیراط}} = 36/4 \text{ g}$$

$$200 \text{ mg} \times \frac{1 \text{ g}}{10^3 \text{ mg}} \times \frac{108 \text{ قیراط}}{1 \text{ قیراط}} = 21/6 \text{ g}$$

۵۲. باتوجه به داده‌های مسئله، آهنگ رشد این گیاه را بر حسب میکرومتر بر ثانیه به روش زنجیره‌ای حساب می‌کنیم:

$$\frac{3/7 \text{ m}}{14 \text{ روز}} = \left(\frac{3/7 \text{ m}}{14 \text{ روز}}\right) \left(\frac{1 \text{ روز}}{86400 \text{ s}}\right) \left(\frac{10^6 \mu\text{m}}{1 \text{ m}}\right) = 3/06 \mu\text{m/s}$$

۵۳. بچه‌ها یادمون باشه پا همون فوت است.

$$30000 \text{ ft} \times \frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}} \times \frac{2/54 \text{ cm}}{1 \text{ in}} \times \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}}$$

$$= 30000 \times 12 \times 2/54 \times \frac{1}{100} = 9144 \text{ m}$$

۵۴

$$2550 \text{ سال} \times \frac{365 \text{ روز}}{1 \text{ سال}} \times \frac{24 \text{ h}}{1 \text{ روز}} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}}$$

$$= 2550 \times 365 \times 24 \times 3600 = 8/04168 \times 10^{10} \text{ s}$$

الف ۵۵

$$14 \text{ گره} \times \frac{0/5144 \text{ m/s}}{1 \text{ گره}} = 7/20 \frac{\text{m}}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ km}}{1000 \text{ m}} \times \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}}$$

$$= 25/92 \text{ km/h}$$

ب

$$25/92 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{1 \text{ mile}}{1852 \text{ m}} = 14 \text{ mile/h}$$

۵۶. ابتدا برای تبدیل  $120 \text{ km}$  به ذرع از سه تبدیل  $1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$  و  $100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$  و  $1 = 10^4 \text{ cm}$  ذرع استفاده می‌کنیم؛ پس می‌توان نوشت:

$$120 \text{ km} \times \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{100 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \times \frac{1 \text{ ذرع}}{10^4 \text{ cm}} \approx 115284/615 \text{ ذرع}$$

سپس برای این که  $120 \text{ km}$  رو به فرسنگ تبدیل کنیم کافیست عدد به دست آمده در بالا را در کسر فرسنگ ذرع ضرب کنیم.

$$120 \text{ km} = 115284/615 \text{ ذرع} \times \frac{1 \text{ فرسنگ}}{6000 \text{ ذرع}} \approx 19/331 \text{ فرسنگ}$$

۵۷. برای تبدیل  $43 \text{ km}$  به فرسنگ از چهار تبدیل  $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$  و  $1 \text{ m} = 10^2 \text{ cm}$  و  $1 \text{ ذرع} = 10^4 \text{ cm}$  و  $1 \text{ فرسنگ} = 6000 \text{ ذرع}$  استفاده می‌کنیم.

$$43 \text{ km} = 43 \text{ km} \times \frac{10^3 \text{ m}}{1 \text{ km}} \times \frac{10^2 \text{ cm}}{1 \text{ m}} \times \frac{1 \text{ ذرع}}{10^4 \text{ cm}} \times \frac{1 \text{ فرسنگ}}{6000 \text{ ذرع}}$$

$$= \frac{43 \times 10^5}{6000 \times 10^4} \text{ فرسنگ} \approx 6/9 \text{ فرسنگ}$$

رشته ریاض

# فیزیک ۱

# کاربرگ امتحان

از خود امتحان بگیر!

مجموعه کتاب‌های  
**بیست‌پیک**



پر فراژدار  
به راحتی برگه‌ها را  
جدا کن و از خودت  
امتحان بگیر!

۱۱ امتحان شامل:

۵ امتحان فصل به فصل

۴ امتحان شبیه‌ساز نوبت اول و دوم

۲ امتحان نهایی اخیر

• پاسخ‌نامه تشریحی به همراه ریزبارم و نکات آموزشی و مشاوره‌ای



مهروماه

قیمت بسته بیست‌پیک:  
۳۲۰۰۰۰ تومان




سؤالات شبیه‌ساز امتحانی		امتحان ۹: نوبت دوم	
رشته: ریاضی و فیزیک	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	ساعت شروع:
سؤالات امتحانی درس: فیزیک ۱	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان:	تعداد صفحه: ۳

ردیف	سؤالات	نمره
۹	<p>در شکل زیر، آب و جیوه در حال تعادل هستند. فشار هوای بیرون چند سانتی‌متر جیوه است؟ (چگالی آب و جیوه به ترتیب برابر <math>1 \text{ g/cm}^3</math> و <math>13/5 \text{ g/cm}^3</math> است.)</p>	۱/۵
۱۰	<p>جسمی به جرم <math>2 \text{ kg}</math>، مطابق شکل از ارتفاع <math>h = 5 \text{ m}</math>، روی سطح شیب‌دار بدون اصطکاک از نقطه A از حال سکون رها می‌شود. الف) تندی جسم در نقطه B چند متر بر ثانیه است؟ ب) اگر روی سطح افقی، نیروی اصطکاکی به بزرگی <math>4 \text{ N}</math> به جسم وارد شود، جابه‌جایی جسم از نقطه B تا لحظه توقف (نقطه C) چند متر است؟ (<math>g = 10 \text{ N/kg}</math>)</p>	۲
۱۱	<p>توان موتور یک پله برقی <math>7500 \text{ W}</math> است. اگر بازده موتور آن <math>80\%</math> باشد؛ الف) توان مفید پله برقی را به دست آورید. ب) این پله برقی در مدت زمان <math>20 \text{ s}</math>، چند شخص <math>80 \text{ kg}</math> می‌تواند از سطح زمین با سرعت ثابت تا ارتفاع <math>3 \text{ m}</math> بالا ببرد؟</p>	۱/۵
۱۲	<p>آزمایشی طراحی کنید که در آن بتوانید ضریب انبساط حجمی مایع را به دست آورید.</p>	۱
۱۳	<p>دمای یک میله فلزی با ضریب انبساط طولی <math>2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}</math> را چند درجه فارنهایت بالا ببریم تا افزایش طول آن <math>0/018</math> برابر طول اولیه‌اش شود؟</p>	۱
۱۴	<p>درون گرماسنجی با ظرفیت گرمایی <math>180 \text{ J/K}</math> مقدار <math>400 \text{ g}</math> آب با دمای <math>20^\circ\text{C}</math> وجود دارد. قطعه‌ای فلزی به جرم <math>500 \text{ g}</math> و دمای <math>100^\circ\text{C}</math> را داخل گرماسنج قرار می‌دهیم. پس از مدتی دمای نهایی مجموعه <math>22^\circ\text{C}</math> می‌شود. گرمای ویژه این فلز چند واحد SI است؟ (<math>c_p = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}</math>) و اتلاف انرژی را ناچیز در نظر بگیرید.</p>	۱/۲۵
۱۵	<p>توسط گرمکنی با توان <math>200 \text{ W}</math> به <math>80 \text{ g}</math> از جسم جامدی با دمای اولیه <math>10^\circ\text{C}</math> گرما می‌دهیم. نمودار دما بر حسب زمان این جسم مطابق شکل مقابل است؛ الف) گرمای ویژه جسم در حالت جامد چند واحد SI است؟ ب) گرمای نهان ذوب جسم در SI چند ژول بر کیلوگرم است؟</p>	۱

## باسمه تعالی

سؤالات شبیه‌ساز امتحانی		امتحان ۹: نوبت دوم	
ساعت شروع:	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	پایه: دهم دوره دوم متوسطه	رشته: ریاضی و فیزیک
تعداد صفحه: ۳	تاریخ امتحان:	نام و نام خانوادگی:	سؤالات امتحانی درس: فیزیک ۱

ردیف	سؤالات	نمره
۱	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را با نوشتن واژه‌های «درست» و «نادرست» مشخص کنید. الف) مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی با گذر زمان تغییر نمی‌کند. ب) هرگاه نیروی دگرچسبی مایع و ظرف بیشتر از نیروی هم‌چسبی مایع باشد، مایع ظرف را ترم می‌کند. پ) انرژی جنبشی با جرم و تندی رابطه مستقیم دارد. ت) در انتقال گرما به روش همرفت، ماده با چگالی کم جایگزین ماده با چگالی زیاد می‌شود. ث) آزمایش‌هایی را که با سرنگ و آب انجام می‌دهیم، سرنگ بیانگر دستگاه و آب بیانگر محیط است.	۱/۲۵
۲	عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید. الف) سال نوری یکای (طول / زمان) است. ب) قیر، جامد (بی‌شکل / بلورین) است. پ) انبساط حجمی مایعات از انبساط حجمی جامدات (بیشتر / کمتر) است. ت) در تراکم بی‌دررو، فشار گاز (افزایش می‌یابد / ثابت می‌ماند / کاهش می‌یابد).	۱
۳	هر یک از جملات زیر را با عبارت مناسب کامل کنید. الف) کمیت‌های فیزیکی که افزون بر عدد و یکا، جهت نیز دارند، کمیت‌های ..... نامیده می‌شوند. ب) اندازه برخی از درشت مولکول‌ها مانند بسپارها تا ..... است. پ) اگر جرم جسمی نصف شود، انرژی پتانسیل آن ..... می‌شود. ت) اساس کار دماسنج‌ها، تغییر ..... است.	۱
۴	الف) با توجه به صفحه تندی‌سنج روبه‌رو، دقت اندازه‌گیری این تندی‌سنج چند کیلومتر بر ساعت است؟ (تندی‌سنج بر حسب کیلومتر بر ساعت تقسیم‌بندی شده است.) ب) مدت زمان سقوط جسمی از یک ارتفاع مشخص، ۵ بار توسط زمان‌سنجی اندازه‌گیری شده است. اگر اعداد زیر، زمان‌های اندازه‌گیری شده باشند، در این آزمایش، زمان سقوط جسم چند ثانیه گزارش می‌شود؟ $۴/۰۳s$ ، $۱/۰۵s$ ، $۶/۰۴s$ ، $۳/۹۸s$ ، $۴/۰۲s$	۰/۷۵
۵	ابعاد حوض آبی $۲m \times ۲m \times ۲/۵m$ است. آب حوض در هر دقیقه، ۳۰۰ L تخلیه می‌شود. اگر در ابتدا حوض پر از آب باشد، چند ثانیه طول می‌کشد تا حوض کاملاً خالی از آب شود؟	۰/۷۵
۶	چگالی جسم A، $۱/۵$ برابر چگالی جسم B است. اگر $۲۰۰ \text{ cm}^3$ از جسم A، $۱۰۰ \text{ g}$ جرم داشته باشد، $۱۰۰ \text{ cm}^3$ از جسم B چند گرم جرم دارد؟	۰/۵
۷	به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) نیروهای بین مولکولی کوتاه‌برد هستند، یعنی چه؟ ب) در چه صورت فشار پیمانه‌ای منفی می‌شود؟	۱
۸	در شکل مقابل، آب در لوله به صورت لایه‌ای جریان دارد. بیشترین و کمترین تندی جریان آب در لوله برابر $۸ \text{ m/s}$ و $۲ \text{ m/s}$ است. اگر شعاع مقطع باریک‌تر لوله $۲ \text{ cm}$ باشد، مساحت مقطع ضخیم‌تر لوله چند سانتی‌متر مربع است؟ ( $\pi = ۳$ )	۱

مهروماه		سوالات شبیه‌ساز امتحانی		امتحان ۹: نوبت دوم															
ساعت شروع:		مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه		پایه: دهم دوره دوم متوسطه															
تعداد صفحات: ۳		تاریخ امتحان:		نام و نام خانوادگی:															
				رشته: ریاضی و فیزیک															
				سوالات امتحانی درس: فیزیک ۱															
ردیف	سوالات	نمره																	
۱۶	درون ظرفی با حجم ۲۰ L مقداری گاز کامل با دمای $27^{\circ}\text{C}$ و فشار ۲ atm وجود دارد. اگر حجم ظرف را نصف کنیم و دما را به $127^{\circ}\text{C}$ برسانیم، فشار گاز چند اتمسفر می‌شود؟	۱																	
۱۷	در جدول زیر، برای هر یک از عبارات‌های ستون (A)، عبارت مناسبی از ستون (B) انتخاب کنید. (در ستون (B) سه مورد اضافی است.)	۰/۷۵																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ستون (A)</th> <th>ستون (B)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الف) قانون اول ترمودینامیک</td> <td>W (۱)</td> </tr> <tr> <td>ب) کار انجام شده در فرایند هم‌فشار</td> <td><math>-P\Delta V</math> (۲)</td> </tr> <tr> <td>پ) تغییرات انرژی درونی در فرایند بی‌دررو</td> <td><math>-nRT</math> (۳)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>صفر (۴)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Q (۵)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>قانون پایستگی انرژی (۶)</td> </tr> </tbody> </table>		ستون (A)	ستون (B)	الف) قانون اول ترمودینامیک	W (۱)	ب) کار انجام شده در فرایند هم‌فشار	$-P\Delta V$ (۲)	پ) تغییرات انرژی درونی در فرایند بی‌دررو	$-nRT$ (۳)		صفر (۴)		Q (۵)		قانون پایستگی انرژی (۶)
ستون (A)	ستون (B)																		
الف) قانون اول ترمودینامیک	W (۱)																		
ب) کار انجام شده در فرایند هم‌فشار	$-P\Delta V$ (۲)																		
پ) تغییرات انرژی درونی در فرایند بی‌دررو	$-nRT$ (۳)																		
	صفر (۴)																		
	Q (۵)																		
	قانون پایستگی انرژی (۶)																		
۱۸	۱ mol گاز کامل، چرخه‌ای ترمودینامیکی مطابق شکل طی می‌کند. ( $1\text{atm} = 10^5\text{Pa}$ ) الف) کار انجام شده توسط محیط روی دستگاه در کل چرخه چند ژول است؟ ب) تغییرات انرژی درونی دستگاه و گرمای مبادله شده در کل چرخه چند ژول است؟	۱																	
۱۹	بازده موتور یک ماشین درون‌سوز ۲۵٪ است و در هر چرخه $5 \times 10^2\text{J}$ کار انجام می‌دهد. گرمایی که موتور از منبع گرم می‌گیرد، چند ژول است؟	۰/۷۵																	
۲۰	جمع نمره																		
صفحه ۳ از ۳																			

۶. از روش تبدیل زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم:

$$60 \text{ s} = 1 \text{ min}, 1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3, 250 \text{ cm}^3 / \text{s} = ? \text{ L} / \text{min}$$

$$250 \frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ cm}^3} \times \frac{60 \text{ s}}{1 \text{ min}} \quad (0/25)$$

$$= \frac{250 \times 60}{1000} \frac{\text{L}}{\text{min}} \quad (0/25) = 15 \text{ L} / \text{min} \quad (0/25)$$

۷. شرح آزمایش:

تراکم پذیری گازها: ۱ یک سرنگ مثلاً ۱۰ سی سی تهیه می‌کنیم. پیستون آن را می‌کشیم تا هوا وارد سرنگ شود. (۰/۲۵)

۲ انگشت خود را محکم روی دهانه خروجی سرنگ قرار می‌دهیم. (۰/۲۵)

۳ تا جایی که می‌توانیم هوای درون سرنگ را متراکم می‌کنیم و از این آزمایش نتیجه می‌گیریم گازها تراکم پذیرند. (۰/۲۵)

تراکم ناپذیری مایع‌ها:

۱ هوای درون سرنگ را خالی و آن را تا نیمه پر از آب می‌کنیم. (۰/۲۵)

۲ با مسدود کردن انتهای سرنگ سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن است، مایع درون آن را متراکم کنیم. (۰/۲۵)


۳ مشاهده می‌کنیم که مایعات تراکم ناپذیرند. (۰/۲۵)

۸. الف) زیرا نیروی دگر چسبی بین جیوه و جداره ظرف کمتر از نیروی هم چسبی بین مولکول‌های جیوه است. (۰/۵)

ب) آب تا زمانی در لوله موئین بالا می‌رود که نیروی دگر چسبی با وزن مایع بالا آمده برابر شود. (۰/۵)

۹. الف) فشار در دو نقطه A و B برابر است؛ زیرا نقاط هم تراز هم فشارند.

$$P_x = \text{فشار وارد بر ته لوله}, \rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3, P_x = 76 \text{ cmHg}$$



$$P_A = P_B \quad (0/25) \Rightarrow 56 + P_x = 76 \text{ cm} \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow P_x = 20 \text{ cmHg} \quad (0/25)$$

$$\text{cmHg} \xrightarrow{\times 1360} \text{Pa} \Rightarrow P_x = 27200 \text{ Pa} \quad (0/25)$$

ب) با استفاده از رابطه  $P = \frac{F}{A}$ ، می‌توانیم F را حساب کنیم:

$$P_x = \frac{F}{A} \quad (0/25) \Rightarrow 27200 = \frac{F}{2 \times 10^{-4}} \quad (0/25)$$

$$F = 54400 \times 10^{-4} \text{ N} = 5/44 \text{ N} \quad (0/25)$$

۱۰. در این سؤال نمودار خوانی حرف اول را می‌زند، بعد از استخراج اطلاعات از روی نمودار به راحتی می‌توانیم P را حساب کنیم:

$$P = \rho gh + P_x \quad (0/25) \Rightarrow 190000 = \rho \times 10 \times 10 + 10^5 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow 190000 - 10^5 = 100\rho \quad (0/25) \Rightarrow 90000 = 100\rho \Rightarrow \rho = 900 \text{ kg/m}^3 \quad (0/25)$$

۱۱. الف)

$$v_1 = 2 \text{ m/s}, A_1 = 2 \text{ cm}^2, v_2 = ? \text{ m/s}, A_2 = 16 \text{ cm}^2$$

با استفاده از رابطه معادله پیوستگی داریم:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad (0/25) \Rightarrow 2 \times 2 = 16 \times v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} \text{ m/s} \quad (0/25)$$

ب) طبق معادله پیوستگی ( $A_1 v_1 = A_2 v_2$ )، مساحت با سرعت رابطه عکس دارد و طبق اصل برنولی، P و v با هم رابطه عکس دارند. (۰/۲۵)

همان طور که در قسمت الف دیدیم v کاهش پیدا کرده؛ بنابراین در قسمت (ب)، P افزایش پیدا می‌کند. (۰/۲۵)

۱۸. خیر (۰/۲۵)؛ چون با وجود این که قانون اول ترمودینامیک  $Q_H = |W| + |Q_L|$  برقرار است، اما در یک ماشین گرمایی، ممکن نیست تمام انرژی داده شده به دستگاه، تبدیل به کار شود ( $Q_L$  نمی‌تواند صفر باشد)؛ در نتیجه قانون دوم ترمودینامیک نقض می‌شود. (۰/۲۵)

**نکته:** اگر می‌خواهید برای یک ماشین گرمایی، قانون دوم ترمودینامیک را بررسی کنید، کافی است بدانید  $|Q_L|$  هرگز نمی‌تواند صفر باشد. (یعنی ماشین گرمایی با بازده ۱۰۰٪ وجود ندارد.)

۱۹. با توجه به قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$|Q_H| = W + Q_L \xrightarrow{W=Pt} |Q_H| = Pt + Q_L \quad (0/5)$$

$$\Rightarrow 48000 = 500 \times 60 + Q_L \Rightarrow Q_L = 18000 \text{ J} \quad (0/5)$$

۲۰. با استفاده از رابطه بازده ماشین گرمایی،  $Q_H$  را محاسبه می‌کنیم:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} \xrightarrow{|W|=Q_H - |Q_L|} \eta = 1 - \frac{|Q_L|}{Q_H} \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow \frac{30}{100} = 1 - \frac{18000}{Q_H} \Rightarrow \frac{18000}{Q_H} = \frac{70}{100} \Rightarrow Q_H = 10 \text{ kJ} \quad (0/5)$$

در نهایت باید حساب کنیم که گرمای ۱۰ kJ حاصل از سوختن چند گرم سوخت است. (۰/۲۵)

$$10 \text{ kJ} = m \times 40 \text{ kJ/g} \Rightarrow m = 0/25 \text{ g} \quad (0/25)$$

### پاسخ امتحان شماره ۶ - نوبت اول

۱. الف) درست (۰/۲۵)؛ در مدل سازی حرکت یک توپ، از مقاومت هوا و اثر وزش باد صرف نظر می‌شود. / ب) نادرست (۰/۲۵)؛ وقتی سعی می‌کنیم فاصله بین مولکول‌های مایع را کم کنیم، نیروی دافعه بزرگی بین آن‌ها ظاهر می‌شود. / ب) درست (۰/۲۵)؛ ارتفاع آب در لوله موئین، با قطر لوله موئین رابطه عکس دارد. / ت) نادرست (۰/۲۵)؛ سرعت کمیت فرعی است.

۲. الف)  $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$  (۰/۲۵) / ب) هم چسبی (۰/۲۵) / پ) کاهش (۰/۲۵) / ت) منفی (۰/۲۵)

۳. به کمک قطره چکان تعداد ۵۰ یا ۱۰۰ قطره آب را داخل یک استوانه مدرج می‌ریزیم تا حجم آن‌ها به دست آید (۰/۵)؛ سپس حجم قطرات را بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کنیم و این گونه می‌توانیم حجم یک قطره آب را به دست آوریم. (۰/۵)

۴. ابتدا خلاصه نویسی می‌کنیم، در مرحله بعد مساحت و ارتفاع را به ترتیب به  $m^2$  و m تبدیل کرده و از ضرب آن‌ها حجم باران باریده شده به دست می‌آید:

$$\begin{cases} A = 150 \text{ km}^2 = 150 \times 10^6 \text{ m}^2 \\ h = 5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-3} \text{ m} \end{cases} \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow V = Ah = 150 \times 10^6 \times 5 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad (0/25)$$

حالا اطلاعات به دست آمده را در رابطه چگالی جای گذاری می‌کنیم:

$$\rho_{\text{آب}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (0/25) \Rightarrow 1000 = \frac{m}{150 \times 10^6 \times 5 \times 10^{-3}} \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow m = 1000 \times 150 \times 10^6 \times 5 \times 10^{-3} = 750 \times 10^6 \text{ kg} = 7/5 \times 10^8 \text{ kg} \quad (0/25)$$

۵. الف) برای دستگاه‌های دیجیتال دقت اندازه‌گیری یک واحد از رقم سمت راست است. (۰/۲۵)

$$10/128 \text{ g} \Rightarrow \text{دقت} = 0/001 \text{ g} \quad (0/25)$$

$$10/128 \text{ g} = ? \text{ ng} \quad (0/25)$$

$$10/128 \text{ g} \times \frac{1 \text{ ng}}{10^{-9} \text{ g}} = 10/128 \times 10^{+9} \text{ ng} \quad (0/25)$$

$$\xrightarrow{\text{نماد علمی}} 1/0128 \text{ g} \times 10^1 \times 10^{+9} \text{ ng} = 1/0128 \times 10^{+10} \text{ ng} \quad (0/25)$$

پاسخ امتحان شماره ۷ - نوبت اول

۱. الف) درست (۰/۲۵)؛ آزمون پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی از نقاط قوت و دانش فیزیک به شمار می‌رود. ب) نادرست (۰/۲۵)؛ شتاب کمیت برداری و فرعی است. پ) درست (۰/۲۵)؛ با کشش سطحی می‌توان توضیح داد که چرا قطره‌های آبی که آزادانه سقوط می‌کنند، کروی هستند. ت) درست (۰/۲۵)؛ فاصله مولکول‌ها در گازها بیشتر از مایعات است؛ بنابراین تندی مولکول‌های گاز بیشتر از مایعات است و پدیده پخش در گازها سریع‌تر از مایعات رخ می‌دهد.

۲. الف) نادیده گرفته می‌شوند. ب) کاهش (۰/۲۵) / پ) ندارد (۰/۲۵) / ت) می‌ماند (۰/۲۵)

۳. تعداد مشخصی سوزن را روی ترازو قرار داده و وزن آن‌ها را اندازه می‌گیریم. (۰/۵)؛ سپس وزن به دست آمده را بر تعداد سوزن‌ها تقسیم کرده تا وزن هر سوزن به دست آید. (۰/۵)

۴. حجم مایع بیرون ریخته شده با حجم قطعه فلز برابر است، پس ابتدا حجم مایع بیرون ریخته شده را حساب می‌کنیم:

$$\rho_{\text{مایع}} = 1/25 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_{\text{فلز}} = ? \text{ g/cm}^3, m_{\text{فلز}} = 168 \text{ g}, m_{\text{مایع}} = 20 \text{ g}$$

$$V_{\text{مایع}} = \frac{m}{\rho} = \frac{20}{1/25} = 16 \text{ cm}^3 \quad (0/25)$$

$$V_{\text{مایع بیرون ریخته شده}} = V_{\text{فلز}} = \left(\frac{m}{\rho}\right)_{\text{فلز}} = \frac{168}{\rho_{\text{فلز}}} = 16$$

$$\Rightarrow \rho_{\text{فلز}} = \frac{168}{16} = 10.5 \text{ g/cm}^3 \quad (0/25)$$

۵. الف) دقت اندازه‌گیری دستگاه‌های دیجیتال، یک واحد از آخرین رقم سمت راست عدد نشان داده شده است. (۰/۵)  $20/218 \text{ g} \Rightarrow \text{دقت} = 0.001 \text{ g}$

ب) با روش تبدیل زنجیره‌ای داریم:

$$20/218 \text{ g} = ? \mu\text{g} \Rightarrow 20/218 \text{ g} \times \frac{10^6 \mu\text{g}}{10^3 \text{ g}} = 20/218 \times 10^3 \mu\text{g} \quad (0/5)$$

۶. در این سؤال از روش تبدیل زنجیره‌ای استفاده می‌کنیم:

$$\frac{0.6 \text{ mm}}{\text{روز}} = ? \frac{\mu\text{m}}{\text{h}}$$

$$\frac{0.6 \text{ mm}}{\text{روز}} \times \frac{10^{-3} \text{ m}}{\text{mm}} \times \frac{1 \mu\text{m}}{10^{-6} \text{ m}} \times \frac{1 \text{ روز}}{24 \text{ h}} \quad (0/25)$$

$$= \frac{0.6 \times 10^{-3} \mu\text{m}}{4 \times 10^{-6} \times 24 \text{ h}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.6 \text{ mm}}{\text{روز}} = \frac{6 \times 10^{-4} \mu\text{m}}{4 \times 24 \times 10^{-6} \text{ h}} = \frac{100 \mu\text{m}}{16 \text{ h}} = 6.25 \frac{\mu\text{m}}{\text{h}} \quad (0/25)$$


۷. شرح آزمایش:

۱. گیره فلزی را به کمک یک تکه دستمال روی آب شناور می‌کنیم. (۰/۵)

۲. چند قطره مایع ظرفشویی کنار گیره فلزی می‌ریزیم. (۰/۵)

۳. نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب کاهش می‌یابد؛ بنابراین کشش سطحی کاهش یافته و گیره در آب فرو می‌رود. (۰/۵)

در این سؤال می‌توان آزمایش کارت و سکه را نیز بیان نمود.



۱۲. چون دو نقطه A و B هم‌ترازند، فشار آن‌ها برابر است.

$$P_A = P_B \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = \rho_2 g h_2 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow 0.8 \times 20 + 2/4 \times 5 = \rho_2 h_2 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow \rho_2 h_2 = 28 \text{ g/cm}^2 \quad (0/25)$$

برای به دست آوردن جرم مایع سوم می‌تونیم از رابطه چگالی استفاده کنیم:

$$m_2 = \rho_2 V_2 \quad (0/25) \quad V = Ah \rightarrow m_2 = \rho_2 A h_2 = (\rho_2 h_2) A \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow m_2 = 28 \times 2 = 56 \text{ g} \quad (0/25)$$

۱۳. تبدیل‌های یکاها را انجام می‌دهیم:

$$1 \text{ km/h} \xrightarrow{\div 3.6} 1 \text{ m/s}, \quad 1 \text{ تن} \xrightarrow{\times 1000} 1 \text{ kg}$$

$$m_{\text{بوزینگ}} = 55 \text{ kg}, \quad v_{\text{بوزینگ}} = 144 \text{ km/h} = 40 \text{ m/s} \quad (0/25)$$

$$m_{\text{فیل}} = 55 \text{ تن} = 55000 \text{ kg}, \quad v_{\text{فیل}} = 18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s} \quad (0/25)$$

$$\frac{K_{\text{بوزینگ}}}{K_{\text{فیل}}} = \frac{\left(\frac{1}{2} m v^2\right)_{\text{بوزینگ}}}{\left(\frac{1}{2} m v^2\right)_{\text{فیل}}} = \frac{55 \times 1600}{55000 \times 25} = \frac{16}{250} = \frac{64}{1000} \quad (0/25)$$

۱۴. الف) با نوشتن رابطه کار برای تک‌تک نیروها، کار آن‌ها را به دست می‌آوریم:

$$W_F = (F \cos 37^\circ) d = (20 \times \frac{4}{5}) \times 200 = 3200 \text{ J} \quad (0/25)$$

$$W_{f_k} = (f_k \cos 180^\circ) d = (4 \times (-1)) \times 200 = -800 \text{ J} \quad (0/25)$$

$$W_{F_N} = 0 \quad (0/25), \quad W_{mg} = 0 \quad (0/25)$$

ب) با استفاده از قضیه کار-انرژی جنبشی، سرعت در انتهای مسیر را محاسبه می‌کنیم:

$$W_T = K_T - K_1 \quad (0/25) \Rightarrow W_F + W_{f_k} + W_{mg} + W_{F_N} = \frac{1}{2} m v_T^2 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow 3200 - 800 = \frac{1}{2} \times 3 \times v_T^2 \Rightarrow 2400 = \frac{1}{2} \times 3 v_T^2 \quad (0/25) \Rightarrow 4800 = 3 v_T^2$$

$$\Rightarrow v_T^2 = 1600 \Rightarrow v_T = 40 \text{ m/s} \quad (0/25)$$

۱۵. با توجه به این‌که در این سؤال اصطکاک نداریم؛ با استفاده از رابطه پایستگی انرژی مکانیکی سؤال را حل می‌کنیم:

$$v_1 = 6 \text{ m/s}, \quad v_2 = 5 \text{ m/s}, \quad h_1 = ? \text{ m}, \quad h_2 = 3 \text{ m}$$

$$E_1 = E_2 \quad (0/25) \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \quad (0/25) \quad \begin{matrix} K = \frac{1}{2} m v^2 \\ U = mgh \end{matrix}$$

$$\frac{1}{2} m \times 36 + mgh_1 = \frac{1}{2} m \times 25 + mg \times 3 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow 18 + 10 \cdot h_1 = 12.5 + 30 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow 10 \cdot h_1 = 12.5 + 30 - 18 \quad (0/25) \Rightarrow h_1 = \frac{24.5}{10} = 2.45 \text{ m} \quad (0/25)$$

۱۶. جرم آب را به دست می‌آوریم و سپس با استفاده از رابطه توان، توان مفید را محاسبه می‌کنیم:

$$V_{\text{آب}} = 0.4 \text{ m}^3, \quad \rho_{\text{آب}} = 1000 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow m = \rho V = 1000 \times \frac{4}{10} = 400 \text{ kg} \quad (0/25)$$

$$P_{\text{مفید}} = \frac{mgh}{t} \quad (0/25) = \frac{400 \times 10 \times 10}{1} = 40000 \text{ W} \quad (0/25)$$

حالا از رابطه بازده استفاده می‌کنیم:

$$Ra = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{کل (صرفی)}}} \quad (0/25) \Rightarrow \frac{40000}{100} = \frac{40000}{P_{\text{کل}}} \Rightarrow 80 P_{\text{کل}} = 40000 \times 100 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow P_{\text{کل}} = \frac{4000000}{8} = 500000 \text{ W} = 50 \text{ kW} \quad (0/25)$$

مجموعه کتاب‌های  
پیشرفت

رشته ریاضی

# خلاصه کیسولی فیزیک ۱

مرور سریع مطالب کتاب درسی

• تعاریف • مفاهیم • فرمول‌ها

• نمودارها • تصاویر



## سازگاری یکها

- در هر رابطه و فرمول فیزیکی، باید یکای کمیت‌ها در طرفین یکسان باشند.
- انواع مختلف یکها می‌توانند در هم ضرب یا تقسیم شوند؛ اما فقط یکاهای یکسان می‌توانند با هم جمع یا تفریق شوند.

## نمادگذاری علمی

- در نمادگذاری علمی، هر عدد را به صورت  $a \times 10^n$  می‌نویسیم که  $1 \leq a < 10$  است.

$$x = 181640 \xrightarrow{\text{نمادگذاری علمی}} x = 1.81640 \times 10^5$$

## مثال

## اندازه‌گیری و دقت وسیله‌های اندازه‌گیری

- به دلیل وجود خطا، هرگز نمی‌توان مقدار قطعی یک کمیت را اندازه گرفت.

## عوامل مؤثر بر دقت اندازه‌گیری

- دقت وسیله اندازه‌گیری (۲) مهارت شخص آزمایشگر (۳) تعداد دفعات اندازه‌گیری

## دقت اندازه‌گیری وسایل مدرج و رقمی

- وسایل مدرج: کمینه درجه بندی وسیله
- رقمی (دیجیتال): یک واحد از آخرین رقم نمایش داده شده

## چگالی

- چگالی یک جسم از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

جرم جسم (kg)  $\rightarrow$   $m$   
حجم جسم ( $m^3$ )  $\rightarrow$   $V$   
چگالی ( $kg/m^3$ )

- در محاسبه چگالی یک ماده، باید حجم واقعی خود ماده را در رابطه جای‌گذاری کنیم.

- اگر جسمی دارای حفره باشد: حجم حفره - حجم ظاهری = حجم واقعی جسم حفره دار

$$\frac{kg}{m^3} \xrightarrow{\div 1000} \frac{g}{cm^3} \xrightarrow{\div 1000} \frac{g}{L}$$

- تبدیل یکاهای زیر را به خاطر داشته باشید:

زمانی که جسمی را در یک مایع می‌اندازیم:

- اگر مایع  $\rho > \rho_{\text{جسم}}$  جسم ته‌نشین می‌شود.

- اگر مایع  $\rho < \rho_{\text{جسم}}$  جسم شناور می‌ماند.

- اگر مایع  $\rho = \rho_{\text{جسم}}$  جسم غوطه‌ور می‌شود.

- چگالی مخلوط: اگر چند ماده را با هم مخلوط کنیم، برای محاسبه چگالی از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_{\text{مخلوط}}}{V_{\text{مخلوط}}} = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

اگر فقط جرم و چگالی معلوم باشد. | اگر فقط حجم و چگالی معلوم باشد.

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{\frac{m_1}{\rho_1} + \frac{m_2}{\rho_2} + \dots}$$

- تذکر** روابط گفته شده برای به دست آوردن چگالی مخلوط به شرطی درست هستند که پس از مخلوط شدن، افزایش یا کاهش حجمی رخ ندهد. اگر کاهش حجم رخ دهد، کفایت درمخرج  $V_3 -$  را جایگذاری نماییم.

## فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

## حالت‌های ماده

- جامد:** دو نوع است: بلورین (مانند الماس) و بی‌شکل (آمورف) (مانند شیشه)

- مایع:** مولکول‌های آن به صورت نامنظم، نزدیک یکدیگر قرار دارند.

- نکته** فاصله بین مولکول‌های مایع و جامد تقریباً یکسان است.

۳ گاز: ذرات آن آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطراف حرکت می‌کنند.

نکته پدیده پخش در گازها سریع‌تر از مایعات است.

۴ پلاسما: در دماهای بسیار بالا به وجود می‌آید. (مانند ستاره‌ها، آتش و...)

### نیروهای بین مولکولی

نیروهای بین مولکولی در فواصل بسیار کم، رانشی و در فاصله اتمی، ربایشی و همچنین در فاصله چندین برابر فاصله اتمی، صفر است.

نوع نیروی بین مولکولی	تعریف	پدیده مرتبط با نیروی بین مولکولی
هم چسبی	جاذبه بین مولکول‌های همسان	کشش سطحی
دگر چسبی	جاذبه بین مولکول‌های ناهمسان	ترشوندگی و مویبندی

### الف) کشش سطحی

نیروی هم چسبی (ربایشی) بین مولکول‌های مایع که باعث می‌شود، سطح مایع مانند یک پوسته تحت کشش رفتار کند. **مثال** کروی بودن قطرات آب در حال سقوط، قرارگرفتن حشرات یا گیره کاغذ روی سطح آب

نکته افزایش دما و افزودن ناخالصی باعث کاهش هم چسبی می‌شود.

### ب) ترشوندگی

در تماس مایع با جامد دو حالت زیر رخ می‌دهد:

مثال	مقایسه نیروی هم چسبی و دگر چسبی	مقایسه نیروی هم چسبی و دگر چسبی
آب سطح شیشه تمیز را تر می‌کند.	دگر چسبی از هم چسبی بزرگ‌تر است.	مایع جامد را تر می‌کند.
جیوه روی سطح شیشه به شکل قطره کروی باقی می‌ماند.	هم چسبی از دگر چسبی بزرگ‌تر است.	مایع جامد را تر نمی‌کند.

چرب کردن سطح شیشه، باعث کاهش دگر چسبی می‌شود.

### پ) مویبندی

بالا یا پایین رفتن مایع در لوله‌های بسیار نازک:

**الف) آب در لوله مویبند:** ۱ آب در لوله مویبند بالا می‌رود. ۲ سطح آب فرورفته است. ۳ با نازک شدن لوله مویبند، سطح آب بالاتر می‌رود.

**ب) جیوه در لوله مویبند:** ۱ جیوه در لوله مویبند پایین می‌رود. ۲ سطح جیوه برآمده است. ۳ با نازک شدن لوله مویبند، سطح جیوه پایین‌تر می‌رود.

نکته فشار هوای محیط و میزان فرورفتن لوله در مایع هیچ تأثیری بر مویبندی ندارد.

### فشار

$$P = \frac{F_{\perp}}{A} \rightarrow \frac{N}{m^2}$$

نکته اگر جسم جامد منشوری فقط تحت تأثیر نیروی وزن باشد:

$$P = \frac{mg}{A} = \rho gh$$

### فشار در شاره‌های ساکن

#### پ) فشار کل در عمق $h$ از سطح آزاد شاره


$$P = P_0 + \rho gh$$

اختلاف فشار بین دو نقطه از یک شاره:

$$\Delta P = \rho g \Delta h$$

نکته در محفظه‌های کوچک گاز، اختلاف فشار در نقاط مختلف ناچیز است.

فشار ناشی از چند مایع برکف ظرف:



$$P = P_0 + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2$$